
2. ÜBUNG ZUR QUANTENMECHANIK

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: 27.04.2010
Besprechung der Präsenzaufgaben: 22./23.04.2010

P 4 Operatoren im Hilbertraum (5 Punkte)

- (a) Zeigen Sie, daß für zwei Operatoren \mathbf{C} und \mathbf{D} gilt $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]^\dagger = [\mathbf{D}^\dagger, \mathbf{C}^\dagger]$.
- (b) Zeigen Sie für selbstadjungierte Operatoren, daß Eigenwerte und Erwartungswerte reell sind.
- (c) Sei \mathbf{B} ein selbstadjungierter Operator, und seien $|\phi_1\rangle$ und $|\phi_2\rangle$ zwei Eigenzustände mit Eigenwerten b_1 und b_2 . Es gelte $b_1 \neq b_2$. Zeigen Sie, daß $|\phi_1\rangle$ und $|\phi_2\rangle$ orthogonal sind.
- (d) Zeigen Sie, daß der Hamiltonoperator mit dem Zeitentwicklungsoperator kommutiert, d. h.

$$[\mathbf{H}, \exp(-i\mathbf{H}t/\hbar)] = 0. \quad (1)$$

- (e) Seien \mathbf{A} und \mathbf{B} zwei selbstadjungierte Operatoren. Unter welcher Bedingung ist der Operator $\mathbf{A}\mathbf{B}$ selbstadjungiert? Zeigen Sie, daß $i[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ selbstadjungiert ist.

S 5 Unschärferelation (7 Punkte)

Wir betrachten zwei selbstadjungierte Operatoren \mathbf{A} , \mathbf{B} auf einem Hilbertraum \mathcal{H} . Unter dem mittleren Schwankungsquadrat $(\Delta\mathbf{A})^2$ des Operators \mathbf{A} versteht man den Erwartungswert von $(\mathbf{A} - \langle\mathbf{A}\rangle)^2$. Es gilt (warum?)

$$(\Delta\mathbf{A})^2 = \langle(\mathbf{A} - \langle\mathbf{A}\rangle)^2\rangle = \langle\mathbf{A}^2\rangle - \langle\mathbf{A}\rangle^2. \quad (2)$$

Wir wollen im folgenden die verallgemeinerte Unschärferelation herleiten:

$$(\Delta\mathbf{A})^2(\Delta\mathbf{B})^2 \geq \frac{1}{4} |\langle[\mathbf{A}, \mathbf{B}]\rangle|^2. \quad (3)$$

Seien $|f\rangle$ und $|g\rangle$ zwei Zustände und $\lambda \in \mathbb{C}$. Betrachten Sie $\| |f\rangle + \lambda |g\rangle \|$ und beweisen Sie durch die Wahl $\lambda = -\langle g | f \rangle / \langle g | g \rangle$ die Schwarzsche Ungleichung

$$\langle f | f \rangle \langle g | g \rangle \geq |\langle f | g \rangle|^2. \quad (4)$$

Ersetzen Sie hierin $|f\rangle$ und $|g\rangle$ durch $(\mathbf{A} - \langle\mathbf{A}\rangle)|\psi\rangle$ bzw. $(\mathbf{B} - \langle\mathbf{B}\rangle)|\psi\rangle$ mit einem beliebigen Zustand $|\psi\rangle$. Die rechte Seite läßt sich dann mit Hilfe der allgemeinen Identität

$$\mathbf{C}\mathbf{D} = \frac{1}{2} [\mathbf{C}, \mathbf{D}] + \frac{1}{2} (\mathbf{C}\mathbf{D} + \mathbf{D}\mathbf{C}) \quad (5)$$

(Beweis?) weiter abschätzen, um (3) zu erhalten.

S 6 Invarianz der Spur

(3 Punkte)

Zeigen Sie, daß die Spur eines Operators von der Wahl der Basis unabhängig ist.

Hinweis: Benutzen Sie die Definition der Spur und schieben Sie an geeigneter Stelle eine geeignete Darstellung des Operators **1** ein.

S 7 Delta-Distribution

(5 Punkte)

Wir betrachten Distributionen in einer Dimension.

(a) Berechnen Sie die zweite Ableitung von $x\theta(x)$.

(b) Zeigen Sie für $a \neq 0$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x). \quad (6)$$

(c) Zeigen Sie, daß die Delta-Funktion mittels

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} f_\epsilon(x - x_0) = \delta(x - x_0) \quad (7)$$

dargestellt werden kann, wenn

$$f_\epsilon = \begin{cases} (2\epsilon)^{-1} & \text{für } |x| \leq \epsilon \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}. \quad (8)$$

Zeigen Sie, daß sie auch eine Darstellung mittels der Gaußkurve besitzt, d. h.

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right] = \delta(x - x_0). \quad (9)$$

Weitere Informationen unter:

<http://www.thphys.uni-heidelberg.de/~ewerz/qm10.html>